



دارد. برای ۱ ثانیه نگه دارید و خود را به سمت کف پایین بیاورید. ۳ الی ۵ سنت ۱۰ تکرار انجام دهید. ما بین هر سرت ۱ دقیقه استراحت کنید. هیچ گونه دردی در ناحیه پاهای خواهد داشت وقتی این حرکت را انجام دهید اما کمی احساس درد در ناحیه کمر طبیعی خواهد بود. این حرکت را چند بار در روز انجام دهید.

#### تمرین هشتم:

با پاهای کپل و شانه های مستقیم و راست بر روی یک طرف دراز بکشید. بر روی بازوی خود تکیه دهید طوری که آرنج دقیقاً زیر کتف قرار می گیرد. کپل خود را از زمین جدا کنید و بر روی بازو و قسمت خارجی مچ پا تعادل یابید. سعی کنید این حالت را ۱۵ ثانیه نگه دارید سپس به آرامی کپل خود را پایین بیاورید. حرکت را برای هر طرف تغییر و تکرار کنید. این حرکت را برای نگه داشتن تا یک دقیقه یا بیشتر تمرین کنید. این تمرین می تواند با زانو و کپل خم شده به طرف سینه آسان تر انجام شود.

تهیه کنندگان: دکتر ملیحه طالبی و دکتر جبرئیل شعبانی

**تمرین پنجم:** با زانوهای خم و پاهای قرارداده شده روی کف اتاق به پشت دراز بکشید. عضلات شکم را منقبض کنید. با دست های کشیده به بیرون در مقابل خود، بالاتنه خود را به سمت جلو خم کنید تا شانه هایتان از کف اتاق جدا شود. این حالت را ۳ ثانیه نگه دارید. نفس خود را متوقف نکنید. این به شما کمک می کند هنگام بالا آوردن شانه هایتان به بیرون نفس بکشید. به پشت بر روی کف آرام بگیرید. این کشیدن خود دست هایتان را در پشت سر محکم بگیرید و آرنج ها را به طرفین بدن بیرون نگه دارید.

#### تمرین ششم :

با زانوهای خمیده به پشت دراز بکشید. مچ یک پا بر روی زانوی پای دیگر قرار دهید. کشاله ران پایی پایی تر را بگیرید و به سمت سینه خود بکشید. کششی در طول کپل و احتمالاً بیرون لگن خاصره احساس خواهد کرد. کشش را ۱۵ تا ۲۰ ثانیه نگه دارید. حرکت را ۳ بار بر روی هر پا انجام دهید.

#### تمرین هفتم:

برای ۵ دقیقه دم روی زمین دراز بکشید. اگر این حرکت بسیار آسیب زننده می باشد یک بالش زیر شکم قرار دهید. این حرکت درد ران و پشت را کاهش میدهد. بعد از دراز کشیدن بر روی شکم به مدت ۵ دقیقه، برای ۵ دقیقه دیگر بر روی آرنج های بسیار بالا تکیه دهید. اگر بتوانید این حرکت را بدون درد بیشتر در ناحیه ران و کپل انجام دهید می توانید قسمت بعدی این تمرین را انجام دهید.

با دست های زیر شانه بر روی شکم دراز بکشید. سپس دست های خود را به پایین فشار داده و آرنج های خود را باز کنید در حالی که کپل بر روی کف قرار


### تمرين سوم:

بر روی زانو و دست تان قرار بگيريد. عضلات شکم خود را منقبض کنيد تا ستون فقرات سفت گردد. در حال حفظ اين حالت يك دست و پای مخالف را دور از بدن بلند کنيد. اين حالت رابه مدت ۵ ثانية نگهداريد. بازو و پاهایتان را به آرامی پاپین بباوريدي و حرکت را در طرف مقابل انجام دهيد. اين حرکت را ۱۰ بار برای هر طرف انجام دهيد.

### تمرين چهارم:

به پشت بر روی کف اتاق با زانوهای خم دراز بکشيد در حالی که کف پاهای برروی زمین باشد، شکم خود را به داخل بکشيد و کمر خود را بر روی کف فشاردهيد، اين حالت را ۱۵ ثانية نگهداريد سپس آرام بگيريد. اين حرکت را ۵ تا ۱۰ بار انجام دهيد.

## Low Back Pain Exercises



به حفظ وضعیت خوب قامت و موقعیت درست ستون فقرات کمک می کنند.  
اگر عضلات شما سفت می باشد قبل از انجام تمرينات دوش یا حمام گرم بگيريد.  
بر روی يك فرش یا حصیر تمرين کنيد. لباس های شل و راحت به تن کنيد  
و کفش نپوشيد. از انجام تمريناتی که باعث ایجاد درد می شوند خودداری کنيد.

این تمرينات تنها يك پیشنهاد است. آن ها را قبل از انجام با پزشك خود  
بررسی کنيد. از فیزیوتراپیست یا پزشك خود بخواهید تا در توسعه يك برنامه  
تمرينی به شما کمک کند. از پزشك خود بپرسيد چند بار در هفته نیاز به  
انجام تمرينات داريد.

توجه: اگر دچار عارضه فتق دیسک یا هر مشکل دیگری هستید قبل از انجام  
تمرينات با پزشك خود آن را بررسی کنيد.

### تمرينات:

#### تمرين اول:

پاشنه يك پا بر روی يك میز با حدود ارتفاع ۱۵ اینچ بگذاري. پای خود  
را راست کنيد. به جلو خم شويد، از مفصل لگن خم شويد تا زمانی که يك  
کشش ملایم پشت ران احساس کنيد. مطمئن شويد که شانه هایتان دچار  
چرخش نشود و همچنین از کمر خم نشويد. می خواهيد پای خود را کشش  
دهيد نه کمر خود را. اين کار را ۳ بار بر روی هر پا انجام دهيد. مدت زمان  
اجرا ۱۵ تا ۳۰ ثانية می باشد.

#### تمرين دوم:

بر روی دست ها و زانوهایتان برويد. اجازه دهيد شکم تان خم شود. اجازه  
دهيد کمرتان به سمت پاپین خمیده شود. اين موقعیت را برای ۵ ثانية نگهداريد.  
سپس کمر خود را قوس دهيد. برای ۵ ثانية نگهداريد. اين حرکت را ۲ ست ۱۵  
تكراري انجام دهيد.

بسیاری از افراد در طول زندگی خود از کمردردهای شدید شکایت کرده‌اند، اما  
این عرضه تا حد زیادی بین انسانها شایع است. کمردرد در بین افرادی که  
به لحاظ جسمی متناسب نیستند، شایع تر است. کمر و ماهیچه‌های شکمی  
ضعیف ممکن است نتواند به خوبی ستون فقرات را حمایت کنند. اگر شما  
یک الگوی زندگی بدون تحرک یا کم تحرک دارید در مقایسه با کسی که  
تقریبا هر روز ورزش می کند، بیشتر در معرض آسیب به کمر خود هستید.  
هم چنین اگر شکم بزرگی دارید این وضعیت فشار اضافی را به ماهیچه‌های  
شما در قسمت تحتانی کمر وارد می کند و شرایط را برای بروز کمردرد فراهم  
می سازد. از سوی دیگر، برخی از کمردردها شامل بیماری دیسک کمر ممکن  
است زائیده ژنهای شما باشند.

نوع شغل نیز تاثیر عمده‌ای روی سلامت این ناحیه از بدن دارد. اگر بر حسب  
ضرورت شغلی ناچار باشید که وزنهای سنگین بلند کنید و یا در تمام  
ساعات روز یک جا بنشینید، سلامت کمر خود را به خطر خواهید انداخت.  
در این میان کشیدن سیگار نیز از جمله فاکتورهای خطرزا برای سلامت کمر  
محسوب می شود. هر چند سیگار کشیدن به طور مستقیم عامل بروز کمردرد  
نیست اما خطر ایجاد درد را در پشت تشید می کند سیگار در واقع مانع  
می شود که بدن بتواند مواد مغذی و ضروری را به دیسک‌های بین مهره‌ای  
در قسمت تحتانی کمر برساند. علاوه بر اینها بعضی از بیماریها مثل پوکی  
استخوان ممکن است سبب بروز کمردرد شوند.

#### ورزش درمانی برای رفع کمر درد

تمريناتی که در زیر ارائه می شود؛ باعث کشش و تقویت عضلات شکم و ستون  
فقرات شده و در رفع کمر درد مؤثر هستند. چرا که عضلات پشت و شکم قوی